



Recherche du Phragmite aquatique en migration prénuptiale

Sur la ZPS FR9112025 du Complexe
lagunaire de Canet - Saint-Nazaire

Synthèse 2025

Groupe Ornithologique du Roussillon
Fédération Départementale des Chasseurs 66





Historique

2011

- 2 sessions de baguage les 11 et 19 avril par le GOR ;
- Aucun capture, mais 4 individus contactés.

2012

- 7 sessions de baguage du 19 au 21 avril puis du 25 au 28 avril ;
- 29 captures (16+13).

D'autres données sur la ZPS :

- 14-24/4/2021 ;
- 15/4/2019 ;
- 17/4/2017 ;
- 20-26/4/2016 ;
- 3/5/2015 ;
- 12-20/4/2015 ;
- 20/4/2014 ;
- 13-29/4/2013



Plan national d'actions du « Phragmite aquatique »
2010 - 2014



Recherche de la migration pré-nuptiale de l'espèce sur le
littoral méditerranéen français
Avril 2012

Mars 2013



Plan piloté par la Dréal Bretagne



Contexte

- Prés de la ville / Cagareil
- Ouverture des travées le 1er avril



Le dispositif

- Protocole ACROLA du CRBPO
- 6 unités (3x 12m) et 6 postes de repasse
- Baguage en continu entre le 12 et le 29 avril 2025
 - Fermeture des filets en moyenne 4h après le lever du soleil




Le dispositif

Unités 3 & 4

Unités 1,2,5 & 6

Le choix de la période d'ouverture

● Valence (Miguélez, 2021) ● Faune Occitanie (et Le Névé, 2013)



Les résultats



15

matinées de
baguage
entre le 12
et le 29 avril

6

Phragmites
aquatiques
bagués et
un
autocontrôle

10

espèces
baguées
et 68
captures

Les résultats


- 1 capture en unité 2 (scirpaie, 13/04)
- 6 captures en unité 3 (agouille/roselière)
- 10% de baguage d’ACROLA sur la période
- 3e espèce la plus baguée (après ACRSCI [migr] et CISJUN [local])

		AVRIL																		TOTAL		
Espèces		12	13	14	15	(16)	17	18	19	20	21	22	(23)	24	25	26	27	28	29	Baguages	Contrôles	Part relative
CETCET	<i>Bouscarle de Cetti</i>						-			1				-			-			1	0	2%
CISJUN	<i>Cisticole des joncs</i>	3	1		1		-	3		1		1(+1)		-	1		-		1(+1)	12	2	19%
SYLALA	<i>Fauvette mélanocéphale</i>						-			1				-			-			1	0	2%
LUSSVE	<i>Gorgebleue à miroir</i>						-		1					-			-			1	0	2%
HIRRUS	<i>Hirondelle rustique</i>			2			-							-			-			2	0	3%
ACROLA	<i>Phragmite aquatique</i>	1	2	0(+1)	1		-	1						-	1		-			6	1	10%
ACRSCH	<i>Phragmite des joncs</i>		2	1		0(+1)	-							-			-	1		4	1	6%
ACRSCI	<i>Rousserolle effarvate</i>		1	1(+1)	4		-			3		3	2	-	6	2	-	4	4(+1)	30	2	48%
ACRARU	<i>Rousserolle turdoïde</i>	1					-	1						-		1	-			3	0	5%
SAXRUB	<i>Tarier des prés</i>		1				-							-			-	1		2	0	3%

Captures	5	7	6	6	1	-	5	1	6	0	5	2	-	8	3	-	6	7	68		
Baguages	5	7	4	6	0	-	5	1	6	0	4	2	-	8	3	-	6	5	62		
Contrôles	0	0	2	0	1	-	0	0	0	0	1	0	-	0	0	-	0	2	6		
Espèces	3	5	4	3	1	-	3	1	4	0	2	1	-	3	2	-	3	2	10		

Les résultats

Masse moyenne : 12,5g +/- 1,2g



* Contrôle du 2nd ind. de la veille

Bilan 2025

- Confirmation de l'intérêt du site pour l'espèce ;
- Bon ratio de captures ;
- Autant de baguage que sur l'ensemble des stations espagnoles ouvertes en migration prénuptiale en 2025 (?)
- Une phénologie de migration mal appréciée ? Plus précoce ? Impact des conditions météo ?
- Pas de fèces collectées malgré application du protocole pour les individus ;
- Budget acquis pour réitérer l'opération en 2026 ;
- Même pression de capture ? disposition différente ?
- Pose d'émetteurs ?

